



Подготовка к МРТ органов малого таза (прямая кишка, мочевого пузыря)

- После проведения колоноскопии МРТ прямой кишки назначают через 5-7 дней.
- За 3 дня до исследования исключить из рациона овощи, фрукты, молочные продукты, газированные напитки, хлеб. Можно употреблять каши, бульон, отварное мясо, рыбу, курицу, сыр, масло и печенье
- В течение 3 дней перед исследованием принимать таблетки «Эспумизан» (по 1 капсуле 3 раза в день).
- Подготовка кишечника: за 1 день до исследования нужно использовать щадящие микроклизмы (Микролакс). При наличии колостомы для очистки отключённого отдела кишки используются очистительные клизмы. Наконечник клизмы — в устье отключённого отдела, после стула — очистительная клизма в задний проход, до чистой воды. С собой необходимо иметь сменный калоприёмник.
- Последний прием пищи за 2-3 часа до исследования.
- За 3 часа до исследования нужно выпить 3 таблетки «Но-шпа» по 40 мг. При непереносимости «Но-шпы» принять 2 таблетки препарата «Дюспаталин» или «Бускопан».
- Перед исследованием необходимо опорожнить мочевой пузырь.

МРТ мочевого пузыря:

- После проведения цистоскопии МРТ мочевого пузыря назначают через 5-7 дней.
- За 1 день до исследования исключить из рациона овощи, фрукты, молочные продукты, газированные напитки, хлеб. Можно употреблять каши, бульон, отварное мясо, рыбу, курицу, сыр, масло и печенье.
- В течение 3 дней перед исследованием принимать таблетки «Эспумизан» (по 1 капсуле 3 раза в день).
- Последний прием пищи за 2-3 часа до исследования.
- За 3 часа до исследования нужно выпить 3 таблетки «Но-шпа» по 40 мг. При непереносимости «Но-шпы» принять 2 таблетки препарата «Дюспаталин» или «Бускопан».
- Накопить мочу: за 1 час до исследования выпить 400-500 мл негазированной питьевой воды.

